

Mémoire

Sur une tumeur anévrysmale
à la cuisse.

par M^r Lamblot Premier Chirurgien en
Survivance de Son Excellence Royale
L'Infant Duc de Parme; et correspondant
de L'Académie Royale de Chirurgie de Paris.



Les connaissances que la Chirurgie moderne a acquises sur
le traitement des différentes tumeurs anévrysmales ne
sont pas encore également évidentes dans toutes les espèces
d'anévrysmes. La situation de la tumeur, son accroissement plus
ou moins tardif, ou plus ou moins prompt, le concours souvent
confus des symptômes et des accidents qui l'accompagnent,
peuvent être autant d'obstacles qui ne permettant pas de fixer
et d'établir un diagnostic absolu et déterminé, soit sur
l'artère blessée, soit sur le lieu où elle peut l'être, contraignent
le Chirurgien à n'oser pas entreprendre des opérations qui
pourroient être utiles, comme l'histoire exacte des maladies
sur lesquelles nous n'avons pas encore toutes les lumières
nécessaires, est le moyen le plus efficace pour augmenter les
progrès de l'art, (toujours trop lents pour le bien de l'humanité)
j'ai cru l'observation suivante propre à faire naître des
idées utiles sur l'espèce d'anévrysme dont il y est question,
sur tout dans des cas qui auroient de la conformité avec
celui-ci, ce qui n'est pas difficile à rencontrer dans la pratique
et sur tout dans les étourdes.



Le nommé François Bayen Grenadier et Anspessade au —
régiment d'Anvers Compagnie de la Bastide âgé de
trente six à quarante ans fut apporté à l'hôpital Royal —
militaire de Vesel sur le Rhin, le vingt-troisième jour du mois
d'octobre de l'année mil sept cent cinquante et huit, à l'occasion
d'une tumeur et névrosique à la cuisse gauche, qui s'étendait
depuis la partie moyenne, jusqu'au ligament de Fallope —
occupant les faces antérieure, interne et externe de cette
cuisse dans toute cette étendue. on y remarquait une pulsation
et une ondulation sensibles partout non seulement au tact
mais même à la vue, principalement au milieu de la
tumeur. elle étoit la suite d'un coup d'épée que le malade
avait reçu, à la partie moyenne antérieure de cette cuisse,
trois mois avant son entrée dans cet hôpital. il me dit
qu'aux premiers pansements, on avait eu beaucoup de
peine à arrêter le sang; que cependant on y avait
réussi à force de tamponnage et de compression, et que
la plaie avait été cicatrisée au bout de vingt à trente
jours; qu'il avait éprouvé de grandes difficultés et de
vives douleurs lorsqu'il voulait marcher, et que peu de
temps après la réunion de la plaie, on avait aperçu
à l'endroit de la cicatrice une petite tumeur, qui
s'étoit conservée assez médiocre pendant les quinze
premiers jours, et qui avait fait depuis ce temps un progrès
très rapide, étant parvenue promptement au point
où je la voyois alors, un gonflement oedémateux —
considérable affectoit déjà toute la cuisse et la jambe.

la tumeur recouvrant et masquant par son volume le tronc
de l'artère Crurale je la cherchai inutilement à vingt reprises
différentes, sans pouvoir en sentir la pulsation la plus sourde et
la plus obscure.

je fis voir le malade à Monsieur Candouille et à Monsieur Desports
qui après l'avoir examiné plusieurs fois avec toute l'attention
possible jugèrent le cas irréversible, en égard à l'étendue de
la tumeur qui ne permettoit pas de distinguer si c'étoit une des
branches principales de la Crurale, s'il n'y en avoit qu'une
ou plusieurs, si ce n'étoit pas le tronc même ou peut être
l'un et l'autre qui fussent affectés; considérations fâcheuses
quine laissoient d'autre ressource que de s'opposer au progrès
et à l'augmentation de la tumeur: ce que je tâchai de
faire par de petites saignées répétées, une diète sévère
et par l'application des topiques astringents soutenus d'une
compression graduée sur toute la Cuisse. la tumeur se soutint
pendant trois semaines à peu près dans le même état. mais
au bout de ce temps les choses changèrent de face. le malade
ressentit des douleurs insupportables dans la partie, la fièvre
s'alluma, la tumeur augmenta en tous sens, et en une seule
nuit je la trouvai accrue d'un tiers surtout vers la face
interne d'où elle gaignoit la face postérieure. toute l'extrémité
devint prodigieusement gonflée et œdématée; le ventre se
tendit, les urines se supprimèrent, le malade tomba dans
l'assoupissement: tout annonçoit une mort très prochaine.
j'employai les apéritifs et les diurétiques qui rétablirent
promptement le cours des urines, je soutins la machine par



Des Cordiaux et des Stomachiques, je ranimai toute cette
extrémité insurante a force de spiritueux, enfin je
rappelai a malheureux a la lumière contre toute
vraisemblance. je supprimai les astringents qui ne
produisoient que peu ou point d'effet. Mon sieur Andouille
qui vint revoir le malade me proposa de donner un coup
de Troiscarts dans la tumeur, persuadé qu'il n'y auroit
aucun risque a le faire, et que je pourrois toujours me
rendre maître du sang, quelque chose qui put arriver.
je souscrivis d'autant plus volontiers a un sentiment
aussi éclairé qu'il s'accordoit davantage avec les idées que
je méditois depuis quelques jours. je ne le fis cependant pas
aussi tôt que je l'aurois voulu, a cause des accidants qui
se renouvelloient tels que fièvre continue assez violente,
diarrhée copieuse, leucophlegmatie, suppression et
rétention d'urine alternatives qui réduisoient le malade
au dernier degré de faiblesse et d'aneantissement. obligé
de combattre de nouveau tant d'accidants fâcheux
j'employai tous les remèdes et tous les moyens qui me
parurent le mieux indiqués; ils eurent du succès. je les
variai de toutes façons pendant un mois. au bout de
ce temps, le malade ayant repris des forces suffisantes,
je crus pouvoir risquer de l'affaiblir par l'évacuation
d'une partie du sang artériel épanché dans la cuisse.
je choisis par préférence la partie inférieure et
latérale externe de la tumeur pour y plonger mon
Troiscart que je poussai obliquement de bas en haut
avec beaucoup de réserve jusqu'à ce que je le sentisse dans le vuide.

je retirai le poignon, et j'en fus pas peu surpris de voir et d'entendre le sang s'élaner par la canule avec une impétuosité et un sifflement aussi forts que s'il fut sorti du ventricule gauche du cœur. J'aperçus à l'instant sur le visage des spectateurs que la surprise avoit produit encore plus d'effet sur eux que sur moi. après avoir tiré trois poëlettes de sang, ce qui fut l'affaire de quelques secondes je fermai la canule avec le bout de mon doigt, et prenant de l'autre main le pouls du malade qui me parut bon et soutenu, je laissai couler de nouveau le sang en quantité égale à la première, comme le but que je me proposois étoit de vider la tumeur au moins en partie, j'examinai très attentivement le changement que pouvoit y apporter l'évacuation du sang, mais voyant qu'elle ne diminuoit en aucun sens après en avoir tiré à différentes fois dix à douze poëlettes (ou la quantité de quatre livres de douze onces chacune) je retirai ma canule et j'appliquai sur le trou du troiscart deux petits morceaux d'agaric de Chêne soutenus d'un appareil convenable.

Je fus convaincu par ce qui venoit de se passer que l'artère étoit aussi ouverte qu'à l'instant de la blessure, et que le sang en découloit avec toute liberté pour s'épancher dans toute l'étendue de la cuisse, à la circonférence de laquelle il s'étoit épaissi par couches dans certains points de la tumeur successivement. le malade tomba en syncope à la fin de l'opération et en revint assez aisément. le sang que je tirai se coaguloit à mesure qu'il tomboit dans le bassin; il étoit d'une couleur vermeille et brillante, caractères essentiels d'un sang artériel qui n'a point éprouvé une longue stagnation. le malade se trouva considérablement affoibli par cette opération.



il me dit le lendemain qu'il avoit senti toute la nuit
un mouvement singulier du sang, qui selon ses expressions,
lui sembloit bouillir dans la tumeur; sensation qu'il
n'avoit pas encore eue jusques là. les douleurs devinrent
bientôt atroces, et il retomba incontinent dans la
situation la plus triste et la plus déplorable. je me
bornai a soutenir la tumeur avec un appareil contentif,
et a l'application immédiate de compresses trempées
dans l'eau de vie aromatique camphrée, et aiguillée
de sel ammoniac. le malade s'affoiblissoit de jour en jour.
il étoit singulièrement difficile de pouvoir le panser,
à raison de la pesanteur prodigieuse du gonflement
énorme de toute l'extrémité, et des cruelles douleurs
que lui causoient les moindres mouvements.

quelques jours après l'opération, j'aperçus à la partie
moyenne antérieure de la tumeur, une portion des
séguements de la grandeur d'une pièce de vingt quatre sols
de France, très émincée; deux jours après j'en aperçus
une autre plus grande à la partie inférieure-interne.
je craignis pour lors une hémorragie mortelle par la
rupture de l'artère vrisine. je fis de nouvelles perquisitions
pour m'assurer et pour sentir le tronc de l'artère Crurale;
mais le gonflement excessif de la tumeur et des
séguements qui gagnoit tout l'abdomen et le dos jusqu'à
l'omoplate du même côté, m'empêcherent plus que jamais
d'apercevoir la moindre pulsation tant l'artère étoit
profondément cachée et enfoncée sous le sang épanché.

malgré cela je formai un point de compression sur
l'endroit de l'écrouelle avec une compresse carrée
de quatre pouces d'épaisseur. je mis un Chirurgien de garde
auprès du malade, en lui recommandant d'appuyer fortement
sur cette compresse au moindre écoulement de sang qui paroîtroit.
quinze jours révolus après l'opération, la tumeur s'ouvrit
pendant la nuit par trois bouches à la fois, non compris
l'ouverture du troiscart qui en s'élargissant en forma une
quatrième. au matin trouvant l'appareil et le
tit remplis de sang, il n'en fallut pas davantage pour m'inspirer
la crainte la mieux fondée. après avoir mis la partie à nud,
je trouvai la tumeur anévrysmale crevée dans son milieu;
à sa partie inférieure interne; enfin à la partie supérieure
et interne vers l'insertion des muscles Triceps. pendant que
j'examinais scrupuleusement cette ouverture supérieure
comme celle qui me paroîttoit le plus redoutable, le sang
jaillit en fourche par deux jets de la grosseur d'une
plume d'oie; ce sang étoit d'une couleur moins éclatante
et plus noirâtre que celui que j'avois tiré précédemment.
incertain si cette hémorragie n'alloit pas terminer la vie
du malade, j'eus le bonheur de découvrir avec mes doigts cette double
embouchure de vaisseaux quelconques, qui fournissoit du sang
si abondamment. ayant eu le bonheur de la trouver j'appliquai
dessus aussi bien que je le pus deux morceaux d'égare
soutenus de beaucoup de charpie de compresses et d'un
vaste bandage à dix huit chefs, car on ne pouvoit plus
employer de bandes. le sang s'arrêta. le malade perdit
par cette hémorragie six fortes poelletes de sang.



le lendemain l'ouverture Centrale qui s'étoit beaucoup
aggrandie, donna passage a un corps considérable
ayant l'apparence d'un Caillot de Sang, noir a la surface,
plus rouge et plus compacte intérieurement. les autres
ouvertures me présentèrent les mêmes objets, mais d'un
plus petit volume. je me contentai de réappliquer
l'appareil, sans vouloir trop mouvoir ce corps singulier
que je ne connoissois pas assez et qui me paroissoit a
craindre. l'hémorragie se renouvela comme le jour précédent
en même quantité, et par la partie supérieure de
la Cuille. le sang étoit d'un noir foncé et d'une odeur
fétide. j'etirai a chaque pansement pendant quelques
jours quelques Caillots de Sang; et les choses se
soutinrent a peu près de même l'espace de huit a dix
jours, au bout de ce tems il se fit de nouvelles ruptures
a la face externe et interne de la tumeur. toute
l'extrémité qui menassoit alors de la pourriture, et la
tumeur d'une hémorragie mortelle, me forcèrent
de mettre tout en œuvre pour me défendre contre
l'une et l'autre. effectivement j'eus le bon heur
de les parer toutes deux. le douzième jour après
la première apparition de cette substance polypeuse
qui pousse au dehors de la tumeur de la grosseur
d'un petit artichaut, dont elle imitoit assez la figure.

après l'avoir tâchée et examinée avec une grande
circonspection, j'écartai de la tumeur légèrement, d'abord
avec mes doigts puis ensuite avec mes tenettes; voyant
qu'elle cédoit aisément au jeu de mes tenettes, je continuai
de la tirer au dehors en la soutenant et en la mouvant
avec mes doigts engagés par dessous et enfoncés dans le
sac anévrisimal. plus j'en tirois en dehors et plus je
m'étonnois de n'en point voir la fin. cependant avec
de la patience, en suivant la même manœuvre, je fis
sortir le tout en présence de Monsieur Cadillac
mon Collègue et de vingt Chirurgiens qui furent
tous singulièrement étonnés du grand volume, de la
nature et de la consistance de ce corps, (présentant vingt
quatre onces) qui fut reconnu après un minut examen pour
une grande portion de la tumeur anévrismale, étant
d'une substance dense, serrée comme le tissu de la ratte
dont les deux tiers étoient formés d'un sang coagulé
par couches. j'ai conservé la partie principale dans
l'esprit de vin pendant six mois. elle s'étoit raccornie au
bout de cetemps au point qu'elle étoit réduite au tiers.
malgré le soin que j'avois de la changer souvent de
liqueur, elle acquéroit promptement une odeur insoutenable.
le lendemain de l'extraction de ce corps singulier, j'en
tirai un second tout semblable, mais beaucoup plus petit.



j'introduisis mon doigt dans cette espèce de caverne
et le portant vers le ligament de fallope, je sentis
évidemment la pulsation de l'artère Crurale, qui
me parut libre et dégagée; ce que je fus bien fâché
de n'avoir pas pu découvrir plutôt.

Toutte l'étendue qu'occupoit la tumeur ne fut plus -
des lors qu'une vaste cavité produite par l'adilacération
des muscles et des téguments. j'y poussai des injections
antiputrides et spiritueuses pour en faciliter la
détersion, et pour la vuidier du sang fétide et
des liqueurs sanieuses qui y enrouissoient. j'aurois
emporté sur le champ tout ce qui formoit l'enveloppe
de la tumeur car les téguments étoient également
émoussés, usés, et presque pourris: mais l'extreme
foiblesse du malade qui étoit au degré supreme de
l'exténuation, et qui depuis vingt quatre heures ne
voyoit ni n'entendoit plus, m'en empêcha. un fluxe -
colligatif qui s'étoit emparé de lui depuis quelques
jours triompha enfin de la Nature et de l'art; et
il mourut le quatorzième jour de novembre, trois
mois après son entrée a l'hôpital de vesel, et
six mois entiers après la blessure.

Examinai la Cuille en présence de plusieurs Chirurgiens tant de Régiment, que de l'hôpital, persuadé qu'elle ne nous offrirait plus rien d'intéressant du côté de la malade. Je ne me trompai pas, du moins autant qu'il étoit possible, lorsque le défaut des instruments propres à injecter les vaisseaux, ne laissent à nos recherches anatomiques d'autres moyens que le scalpel. ayant désigné avec attention le tronc de l'artère crurale jusqu'aux iliaques, par en haut, et jusqu'au puyet inférieurement, je le trouvai dans son état naturel. la veine crurale étoit dilatée en forme d'entonnoir l'espace de quatre travers de doigt, vers l'endroit qui venoit au centre de la tumeur anévrysmale. l'isthme des muscles dilacérés étoit au lieu toute leur surface imbus d'une espèce de larme verdâtre, dont ils avoient même pris la teinte. les viscères parurent sains et en bon état. il y avoit cependant un peu de l'échelle épaisse dans le bas ventre.

L'histoire de cette grande maladie depuis son commencement jusqu'à la fin, présente à l'art des considérations utiles, - applicables à des cas remarquables. pour recueillir quelque fruit de cette observation, il faut décider du siège du mal, et après un examen réfléchi de ses différents périodes, et de ses variations tirer des inductions pratiques propres à encourager et à cauter dans pareilles conjonctures.



1°. quant au siège de la maladie, en réfléchissant sur la direction du coup d'épée, et sur la situation de la tumeur qui parut aux environs de la plaie peu de temps après la réunion, il est certain qu'une des branches principales de l'artere Crurale, nommée par Mondieu Vinsloue, branche externe, qui fournil aux muscles Crural, vaste externe et pectiné antérieur, est précisément celle qui a été divisée par l'épée. — Le tamponnage et la compression en ont produit la réunion qui trop faible pour résister à l'impulsion du sang, a permis par la rupture l'épanchement du sang d'abord aux environs de la plaie, puis successivement dans toute la cuisse, ^{ce qui a} ~~et de~~ formé une région anévrysmale faux ou par épanchement. mais l'accroissement rapide de la tumeur ne laissoit déjà plus lieu, lors de l'entrée du malade à l'hôpital de pouvoir distinguer si c'étoit précisément cette branche, ou toute autre, ou plusieurs ensemble, et peut-être le tronc lui-même qui fussent affectés; n'ayant d'ailleurs pour nous éclairer sur les premiers temps de cette maladie, que le récit du malade toujours très inexact et très infidèle dans une matière aussi importante, et sur tout de la part d'un soldat.

2°. il est évident qu'on auroit dû tenter l'opération de l'anévrysmes avant que la tumeur fut parvenue au degré où elle étoit avant que le malade vint à cet hôpital.

mais alors on ne le pouvoit plus, puis que la tumeur avoit
acquis un volume si considérablement étendu qu'elle
masquoit et recouroit entièrement le tronc de la Crurale
à son passage au pli de l'aîne. comment auroit on pu
compter sur une compression suffisante de ce tronc
principal (qui étoit couvert autant qu'on pouvoit
l'estimer par le tact d'un sang soit fluide soit coagulé
de la hauteur de deux pouces) pour se rendre maître du
sang autant et aussi sûrement qu'il l'eût fallu dans une
opération aussi grave, aussi incertaine, aussi laborieuse,
et par là aussi longue qu'eût été celle qu'on auroit tentée?
ce fut donc l'impossibilité que je trouvais à faire une
compression sûre et immédiate, en égard au sang intermédiaire
entre le tronc de l'artère et les téguments, qui m'empêcha
d'oser entreprendre l'opération de l'aneurysme, quelques
secours que je pusse attendre dans pareilles circonstances de
Collègues éclairés et bons praticiens, et surtout des lumières
supérieures de Monsieur d'Andouille; sans parler de la
connoissance que j'avois du succès de cette opération
faite au tronc même de la Crurale vers le milieu de la
cuisse, à l'occasion d'un coup d'épée, rapportée par
Saviard dans ses observations, ainsi que d'un fait
à peu près pareil de Marcus et Aurelius Severinus.



3°. il est incontestable que la ponction que j'e fis seconda-
et favorisa beaucoup la nature quelque accablée qu'elle
fut par une maladie aussi grande et aussi compliquée. -
c'est un objet très important à développer et à éclaircir.
pour y parvenir, il faut en premier lieu se représenter
l'état actuel de la tumeur au temps de la ponction. elle
occupait alors toute la circonférence de la cuisse, à
l'exception d'une petite partie de la face postérieure.
on y sentait par tout à peu près la même pulsation et
la même ondulation, un peu plus ou un peu moins obscures
dans certains points. quoique les doubles poëllettes de sang
que je tirai par la ponction de cette énorme tumeur n'y
eussent apporté aucune diminution visible à l'instant,
comme je l'ai dit plus haut, elles produisirent cependant
l'évacuation d'une partie considérable du sang fluide
qui y étoit contenu. cette évacuation diminuant
de beaucoup la pesanteur que souffroient toutes les
branches et tous les vaisseaux compris dans l'étendue
de cette tumeur, leur redonna ainsi qu'au tronc même
plus de jeu et plus de facilité dans l'exécution de leur
diastole et de leur systole; d'où suivit peu de temps
après l'opération cette sensation nouvelle pour le
malade, qu'il exprimait par ces mots; il me semble
que mon sang bouille dans ma cuisse.

il faut en second lieu considérer cette vaste tumeur anévrysmale composée de deux sortes de sang, dont l'un coagulé et réduit en couches forment comme la paroi intérieure des teguments et la circonférence de l'anévrysme, et l'autre encore fluide en formoit le centre. ceci posé, l'évacuation du sang par la ponction ne pût pas causer à la tumeur une diminution sensible à la vue, parceque les teguments affoiblis et distendus, tout-prêts à se rompre, soutenus d'ailleurs et étayés intérieurement par le sang coagulé, ne purent pas prendre leur ressort, et se rapprocher des muscles en raison du vuide réel que l'évacuation de quatre livres de sang avoient pourtant produit effectivement au centre de la tumeur. cependant ce même sang coagulé n'étant plus soutenu par le même volume de fluide, les teguments privés à leur tour de l'appui qu'il leur donnoit furent obligés de s'affaiblir peu à peu quoiqu'in sensiblement, affaiblissement qui seconda le jeu des artères devenu plus libre et plus fort par l'évacuation du sang faite par la ponction, et davantage encore par les hémorragies qui lui succéderent, donna lieu par le rapprochement du tout ensemble, à la formation du Caillot qui parvint à consolider l'artère ouverte, et à l'arrangement de ce corps polypeux d'un volume si surprenant que je tirai environ trente jours après la ponction.

Que peut-on inférer de tout ceci? j'en conclus que dans pareils cas ou l'opération de l'anévrysme seroit aussi dangereuse



a exécuter, pour ne pas dire ou elle seroit aussi impraticable, on peut et l'on doit sans hésiter faire la ponction à la tumeur qui pourroit être d'autant plus avantageuse, qu'on la feroit dans un tems ou le malade auroit encore des forces suffisantes.

Si l'on veut bien peser et mûrement examiner tous les changements arrivés à la tumeur depuis la ponction, jusqu'à l'extraction des corps polypeux, j'erois qu'on sera forcé de convenir, qu'on peut tout attendre dans pareilles conjonctures de cette opération faite à temps; qu'on doit alors en attendre tous les avantages ci-dessus détaillés; et que par son moyen on peut se flatter de sauver probablement l'avis à ceux qui seroient affligés d'une maladie aussi cruelle: car il est démontré par l'historique de mon observation, que le malade qui en est le sujet, est mort des accidents la plupart symptomatiques qui se sont joints à la triste situation, en même tems qu'il a été guéri de ce terrible Anévrisme.

à Paris le quinze Juillet mil sept cent soixante
et deux

Lambert premier Chirurgien en
survivance de son Excellence Royale
L'Infant Duc de Parme.

no 44